



IV (ANESTESIA INTRAVENOSA) (En la Oficina)

Ha sido recomendado que Anestesia Intravenosa sea usada para realizar el tratamiento dental de su hijo(a). La sedación, el chequeo continuo de las señales vitales y la recuperación del paciente serán manejados por el Doctor Anestesiólogo durante el transcurso del tratamiento.

Un depósito de \$550.00 dólares necesita ser pagado al Anestesiólogo para reservar la cita, éste será después aplicado a la primera hora de anestesia. Si el tiempo bajo anestesia se extiende más de una hora, una cuota de \$110.00 dólares por cada 15 minutos adicionales será aplicada y es pagadera al momento que se completa el tratamiento.

SIN EMBARGO SU DEPÓSITO SE PERDERA SI...

- **Una noticia de cancelación no es recibida en nuestra oficina 5 días laborables antes de su cita.**
- **Usted no se presenta a su cita.**
- **Usted no sigue las instrucciones recibidas con respecto a no ingerir comida o bebida inmediatamente antes de su cita (incluyendo goma de mascar), pues ésto no solamente representa un gran riesgo para el paciente sino que puede causar que se cancele su cita.**

Por favor note: El siguiente plan de tratamiento está basado en una examinación visual solamente. En el día del tratamiento, radiografías pueden ser tomadas y pueden haber cambios en el tratamiento del paciente. Además procedimientos preventivos como sellos pueden también ser completados, (si es que éstos son necesarios).

Si usted tiene alguna pregunta referente a esta forma, por favor pregunte a nuestro personal o a uno de nuestros doctores antes de firmarla.

He leído, entiendo y estoy completamente enterado y de acuerdo con la Poliza de Sedación.

Firma del Padre o Tutor Legal

Fecha

Nombre del Paciente

Testigo

Firma del Doctor

Firma del Testigo



INSTRUCCIONES PARA PACIENTES ANTES DE LOS/SERVICIOS DE ANESTESIA

Las siguientes instrucciones son tan importantes que el no seguirlas puede resultar en enfermedades severas o hasta la muerte. Por esta razón el no seguir estas instrucciones puedes causar que tengamos que cambiar su cita de anestesia.

Los padres no pueden acompañar al paciente durante el tratamiento dental.

COMIDA Y BEBIDA:

Nada por la boca (comida o líquidos) debe ser dado al paciente después de la media noche del día anterior a la cita a menos que lo haya discutido con el Dr. Anestesiólogo. Esta será la única vez que le pedimos a usted que no le lave los dientes a su hijo (a). Esto es para prevenir el ingerir líquidos accidentalmente.

MEDICINAS:

El paciente debe tomar sus medicinas diarias normalmente a menos que el Dr. Anestesiólogo le diga lo contrario.

VESTIMENTA:

El paciente debe usar ropa cómoda como pantalones cortos y camiseta manga corta. Para niños pequeños se recomienda traer un cambio de ropa extra. El paciente no debe usar joyería o lentes de contacto en ese día.

TRANSPORTACION:

Un adulto responsable debe conducir al paciente a casa después del tratamiento. No es aceptable usar medios de transporte público después de haber recibido tratamiento bajo anestesia. El paciente no debe manejar durante las próximas 24 horas después del tratamiento, además un adulto responsable debe de cuidar del paciente por el resto de ese día .

CAMBIO EN LA SALUD:

Por favor informe al Dr. Anestesiólogo de cualquier cambio de salud en el paciente tan pronto como sea posible. Algunas enfermedades pueden necesitar un retraso en su tratamiento.

DOLOR:

Tome medicina para el dolor como le fué indicado. El dolor dental después del tratamiento es mejor manejado tomando medicinas como Ibuprofen (Advil, Motrin, etc.) si es que el paciente lo tolera bien. No espere a que empiece el dolor. Si el paciente no puede tomar este tipo de medicamento entonces es recomendado el uso de Acetaminofen (Tylenol) conforme a lo indicado en el empaque .

COMIDA Y BEBIDA DESPUES DEL TRATAMIENTO:

Empiece con líquidos claros. Poco a poco introduzca comidas suaves a la dieta. Si el paciente está sangrando de la boca lo mejor es darle líquidos fríos para empezar. Es posible que se haya usado anestesia local durante el tratamiento, por ello por favor evite comidas sólidas en las que el paciente tenga que masticar hasta que el adormecimiento en la boca se haya ido (mas o menos 2 horas). Si el paciente tiene náuseas o vómitos por favor llame al Dr. Anestesiólogo o a nuestra oficina.

ELEVACION DE LA TEMPERATURA EN NIÑOS:

Su niño (a) puede experimentar un incremento de temperatura después de terminado el tratamiento. Esto es usualmente debido a la inhabilidad del paciente para sudar cuando se le administra una de las medicinas de anestesia. La mejor manera de controlar esto es dándole **al paciente muchos líquidos o dándole Tylenol, Advil o Motrin como se recomienda en la etiqueta del fabricante (siempre y cuando el paciente no es alérgico a estas medicinas y puede tolerarlas)**, sin embargo si la temperatura corporal del paciente sube arriba de 101° F. por favor llame al Dr. Anestesiólogo o a nuestra oficina.

Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a nuestra oficina al (562) 377-1375.

HE LEIDO Y ENTIENDO LO ARRIBA DESCRITO: _____ FECHA: _____

Santos Cortez, D.D.S., Inc. – Ana M. Planells, D.D.S. – Estela Sanchez, D.D.S.

3320 Los Coyotes Diagonal - Suite 200 - Long Beach, CA 90808 – (562) 377-1375 – Fax (562) 377-1343 – www.PediatricDentalSpecialists.net